

Aumento Glúteo con tejido adiposo (Lipofilling)

Planificación de sus requerimientos y necesidades: El Dr Diego Polanco le realizará en la consulta antes de operarse una evaluación donde se definirán las zonas que se deben lipoaspirar en su cuerpo para poder lograr un volumen suficiente de grasa para realizar el aumento glúteo.

Tipo de Anestesia: General

Tiempo de Duración de la Cirugía: 2 horas.

Incisiones: pequeñas incisiones de 3-4 mm que se tratarán de ocultar en zonas determinadas en la medida de lo posible.

Uso de drenaje: No se utilizan drenajes.

Alta: al día siguiente

Reintegro laboral: dependiendo de la extensión del procedimiento desde 2-3 días a 2 semanas.

Retiro de puntos: 14 días, aunque la mayor parte de las suturas no deben ser retiradas.

Uso de la faja: mínimo 1 mes, hasta 3-6 meses.

Kinesiterapia postoperatoria: Puede realizar tratamientos de drenaje linfático y masoterapia entre otros desde 1 a 2 días posterior a la cirugía y por 5 a 10 sesiones como mínimo.

Inflamación de los tejidos: hasta 6 meses después de la cirugía, momento que el resultado es ya más definitivo. Cercano al año se suele completar la retracción de los tejidos.

Estado de la cicatriz: puede parecer que empeora incluso los primeros meses, pero desde los 9 a 12 meses mejorará su aspecto progresivamente en la mayoría de los pacientes.

Evitar contacto físico y deportes al menos: hasta sentirse cómodo(a) al menos por 1 mes

Complicaciones: acumulación de líquido o seroma, sangrado, infecciones, alteraciones de la sensibilidad. Pérdida de piel en relación a la herida. Todas estas complicaciones se minimizan en manos de un especialista acreditado y serio.

Duración del resultado: Si desea un mayor volumen glúteo o más permanente se suele indicar el uso de un implante glúteo de silicona.