

## Lifting de muslos

Planificación de sus requerimientos y necesidades: El Dr Diego Polanco le realizará en la consulta antes de operarse una evaluación donde se definirá la resección de piel, la necesidad de aspiración de grasas así como las cicatrices necesarias.

Tipo de Anestesia: General

Tiempo de Duración de la Cirugía: 2-3 horas.

Incisiones: en la ingle, vertical en la cara interna del muslo o ambas.

Drenaje: Se retira entre 2 a 7 días posterior a la cirugía.

Uso de faja: por un mes como mínimo hasta 2 a 3 meses.

Alta: al día siguiente

Reintegro laboral: desde 1 a 3 semanas.

Retiro de puntos: 15 días

Kinesiterapia postoperatoria: Puede realizar tratamientos de drenaje linfático y masoterapia entre otros desde 1 a 2 días posterior a la cirugía y por 5 a 10 sesiones como mínimo.

Inflamación de los tejidos: puede persistir hasta 3 a 6 meses después de la cirugía. Cerca del año desde la intervención el resultado es ya definitivo.

Estado de las cicatrices: puede parecer que empeora incluso los primeros meses, pero desde los 9 a 12 meses las cicatrices comienzan a mejorar su aspecto en la mayoría de los pacientes.

Evitar contacto físico y deportes al menos: hasta sentirse cómodo(a) al menos por 1 mes

Complicaciones: sangrado, infecciones, alteraciones de la sensibilidad, pequeñas irregularidades, pérdida de piel en relación a la herida. Todas estas complicaciones se minimizan en manos de un especialista acreditado y serio.

Duración del resultado: Permanente salvo cambios considerables de peso.