

Lifting facial y/o cervical

Planificación de sus requerimientos y necesidades: El Dr Diego Polanco le realizará en la consulta antes de operarse una evaluación donde se definirá su estructura facial, y la necesidad de estiramiento facial, cervical, relleno con tejido adiposo o de blefaroplastias adicionalmente.

Tipo de Anestesia: General

Tiempo de Duración de la Cirugía: 3-5 horas.

Incisiones: escondidas en la línea del pelo, delante de la oreja y detrás de esta.

Drenaje: Se retira entre 2 a 7 días posterior a la cirugía.

Uso de vendaje facial: llevará una especie de "faja" durante el primer mes.

Alta: al día siguiente

Reintegro laboral: desde 1 a 3 semanas.

Retiro de puntos: 7-10 días

Kinesiterapia postoperatoria: Puede realizar tratamientos de drenaje linfático y masoterapia entre otros desde 1 a 2 días posterior a la cirugía y por 5 a 10 sesiones como mínimo.

Inflamación de los tejidos: hasta 3 a 6 meses después de la cirugía, momento que el resultado es ya más definitivo.

Estado de la cicatriz: puede parecer que empeora incluso los primeros meses, pero desde los 9 a 12 meses mejorará su aspecto progresivamente en la mayoría de los pacientes.

Evitar contacto físico y deportes al menos: hasta sentirse cómodo(a) al menos por 1 mes

Complicaciones: sangrado, infecciones, alteraciones de la sensibilidad. Daño del nervio facial o de alguna de sus ramas que puede generar alteraciones en la movilidad facial. Pérdida de piel en relación a la herida. Todas estas complicaciones se minimizan en manos de un especialista acreditado y serio.

Duración del resultado: 5 a 10 años. En determinados pacientes cuando persiste el hábito tabáquico, la exposición solar indiscriminada o cambios considerables de peso, el resultado puede ser inferior.