

Reducción de Mamas

Planificación de sus requerimientos y necesidades: El Dr Diego Polanco le realizará en la consulta antes de operarse una evaluación donde se definirá la cantidad de tejido mamario y piel que se debe reseca, el tipo de cicatrices que quedarán así como la forma, tamaño y caída que la paciente desea de su nueva mama.

Tipo de Anestesia: General

Tiempo de Duración de la Cirugía: 3 horas.

Incisiones: alrededor de la areola, una incisión vertical y generalmente una horizontal.

Uso de drenaje: por 2 a 5 días después de la cirugía.

Alta: al día siguiente

Reintegro laboral: desde 1 a 3 semanas.

Retiro de puntos: 14 días

Kinesiterapia postoperatoria: Puede realizar tratamientos de drenaje linfático y masoterapia entre otros desde 1 a 2 días posterior a la cirugía.

Uso del sostén: mínimo 1 mes sin aro metálico, posteriormente y en caso de que las cicatrices estañen absolutamente cerradas, puede utilizar un sostén convencional.

Inflamación de los tejidos: hasta 2-3 meses después de la cirugía, y cerca de los 6 meses el resultado es ya más definitivo.

Estado de las cicatrices: puede parecer que empeora incluso los primeros meses, pero desde los 9 a 12 meses las cicatrices comienzan a mejorar su aspecto en la mayoría de los pacientes.

Evitar contacto físico y deportes al menos: hasta sentirse cómodo(a) al menos por 1 mes

Complicaciones: acumulación de líquido o seroma, sangrado, infecciones, alteraciones de la sensibilidad, pequeñas dehiscencias en alguna de las cicatrices. Pérdida de piel parcial o total de la areola y pezón. Todas estas complicaciones se minimizan en manos de un especialista acreditado y serio.

Duración del resultado: Permanente salvo grandes cambios de peso o embarazo o de acuerdo a sus tejidos.