

Tratamiento con Ácido Hialurónico (Juvederm)

Planificación de sus requerimientos y necesidades: El Dr Diego Polanco le realizará en la consulta antes de realizar el procedimiento una evaluación donde se definirán las zonas faciales a tratar. Además se señalarán las limitaciones del tratamiento y los resultados razonables que se pueden lograr.

Tipo de Anestesia: Se usa frío local o artefactos que mediante vibración disminuyen el dolor. También se pueden utilizar cremas anestésicas tópicas. Incluso el producto mismo incluye lidocaína, que es un anestésico local.

Tiempo de Duración del tratamiento: 30 minutos a 1 hora.

Sitios de inyección: frente, entrecejo, costados laterales de ojos, labios, mejilla, párpados, cejas, nariz, surco nasogeniano, mentón.

Efecto: Se aprecia el efecto al terminar el procedimiento, mejora progresivamente por unos días.

Uso de hielo local: se recomienda por las primeras 24 hrs.

Reposo: durante el primer día dormir con el cabecero de la cama elevado,

Reintegro laboral: Es un procedimiento ambulatorio, puede trabajar incluso pasado unas horas o el día siguiente.

Masajes postoperatorios: No se recomienda la manipulación de las zonas que se trataron.

Inflamación de los tejidos: puede haber cierta inflamación dependiendo de cada paciente y por un tiempo relativo a las características de los tejidos de cada paciente.

Evitar contacto físico y deportes: 24-48 hrs

Complicaciones: Se detallan en el respectivo consentimiento informado que se le ha entregado

Duración del resultado: Generalente 6 a 12 meses aunque depende de cada paciente.