

## Tratamiento con toxina botulínica (Botox)

Planificación de sus requerimientos y necesidades: El Dr Diego Polanco le realizará en la consulta antes de realizar el procedimiento una evaluación donde se definirán las zonas a tratar: perioculares, glabellares, frontales, bucales o cervicales. Además se señalaran las limitaciones del tratamiento y los resultados razonables que se pueden lograr.

Tipo de Anestesia: Se usa frío local o artefactos que mediante vibración disminuten el dolor. También se pueden utilizar cremas anestésicas tópicas.

Tiempo de Duración del tratamiento: 30 minutos.

Sitios de inyección: frente, entrecejo, costados laterales de ojos (patas de gallo), boca, cuello.

Efecto: Se aprecia el efecto desde 4 a 6 días, siendo más claro entre 15 a 21 días.

Uso de hielo local: se recomienda por las primeras 24 hrs.

Reposo: durante el primer día dormir con el cabecero de la cama elevado,

Reintegro laboral: Es un procedimiento ambulatorio, puede trabajar incluso pasado unas horas o el día siguiente.

Masajes postoperatorios: No se recomienda la manipulación de las zonas que se trataron.

Inflamación de los tejidos: puede haber cierta inflamación el primer día, luego es imperceptible.

Evitar contacto físico y deportes: 24-48 hrs

Complicaciones: Se detallan en el respectivo consentimiento informado que se le ha entregado

Duración del resultado: Generalente 4 a 8 meses aunque depende de cada paciente. Se han descrito ciertos pacientes en que la toxina botulínica tiene escaso efecto.